

## Recommandations CNESST sur le port du N95 Mise à jour 2022-09-13

### **Endroits ciblés :**

Centre hospitalier, CHSLD, RPA, RI, RTF (personnel du CISSS), SNT, RAC, URCI, Internat ou foyer de groupe, centre jeunesse, SAD, centre de réadaptation, clinique médicale, GMF, centre de dépistage et clinique externe.

### **Moment exclu pour le port du N95 (zone froide) :**

Usager/résident ou département répondant à l'ensemble des critères suivants :

- Sans symptômes suggestifs pour la COVID-19, nouveaux ou aggravés;  
ET
- sans aucune exposition documentée à un cas connu ou un milieu où il y a une éclosion de COVID-19 (ex. : CHSLD, RPA) dans les **10** derniers jours;  
ET
- ayant reçu un résultat négatif à un test de dépistage pour le SRAS-CoV-2 **OU** port du masque en continu chez l'usager.

### **Définition d'usager/résident considéré à risque :**

- Tableau clinique compatible avec la COVID-19, sans diagnostic alternatif;
- Usager avec symptômes de la COVID-19<sup>1</sup> nouveaux ou aggravés, sans diagnostic alternatif ou sans l'obtention d'un résultat négatif;
- Usager sans symptômes avec facteur de risque d'exposition<sup>2</sup>;
- Usager considéré contact étroit;
- Usager avec un diagnostic autre que la COVID-19, mais présentant un ou des symptômes compatibles avec la COVID-19 et sans l'obtention d'un résultat de laboratoire négatif.

### **Définition d'usager/résident confirmé (positif) :**

- Confirmé par laboratoire;
- Confirmé par test rapide;
- Confirmé par lien épidémiologique.

### **Définition zone tiède :**

- Pièce où séjourne un usager suspect (avec tableau clinique compatible ou ayant des symptômes communs ou non, sans diagnostic alternatif);
- Usager avec facteur de risque élevé, contact étroit.

<sup>1</sup> Voir appel à la vigilance à jour.

<sup>2</sup> Voir questionnaire COVID-19.

### Définition zone chaude :

- Pièce où séjourne un usager positif;
- Département en éclosion.

### Principes directeurs :

- **Pour les centres hospitaliers, CLSC, cliniques médicales, GMF et UMF, il est recommandé de faire porter le masque de procédure à l'usager en tout temps, lorsque toléré, dès qu'il est couché sur une civière ou hospitalisé, surtout lors de soins à moins de 2 mètres;**
- **Le questionnaire COVID-19 doit être effectué chez tous les usagers qui se présentent dans nos installations;**
- **Lorsque le N95 est requis, le port de la protection oculaire est obligatoire;**
- Pression négative requise chez les cas positifs lorsque possible (milieux de soins);
- Respect du délai de changement d'air à l'heure avant d'entrer dans la pièce sans ÉPI lorsque la pression négative est présente (milieux de soins);
- Pour les mesures, en présence d'IMGA, voir document « Guide synthèse IMGA ».

### Ordre de priorité d'utilisation des chambres à pression négative pour les cas positifs :

1. Présence d'IMGA;
2. Plusieurs usagers dans une chambre ayant des symptômes;
3. Plusieurs usagers dans une chambre sans symptôme;
4. Un (1) usager dans la chambre avec symptômes et recevant des anticorps monoclonaux;
5. Un (1) usager dans une chambre ayant des symptômes;
6. Un (1) usager dans une chambre sans symptôme.

Milieux	Consignes pour le port du N95 <u>par le personnel</u>
<p>CH (unité d'hospitalisation, USI, CME, pédiatrie, psychiatrie)</p> <p><b>Urgence (excluant le triage)</b></p> <p>CHSLD</p> <p>Centre de réadaptation</p> <p>Centre jeunesse</p> <p>RPA RI, RAC</p> <p>Internat ou foyer de groupe</p> <p>Maison de soins palliatifs</p> <p>Bloc opératoire/endoscopie</p>	<p><u>Instaurer le N95 en présence d'usagers/résidents/département répondant à la définition de zone tiède ou chaude.</u></p> <p><b><u>N. B. Lors d'instauration :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porter le N95 en continu;</li> <li>• Le changer lorsque souillé, humide, à la pause, au dîner (max. 8 h);</li> <li>• Utiliser un maximum de 4 masques N95 par quart de 8 h.</li> </ul>
<p>Clinique externe :</p> <p>Gynécologie, ophtalmologie, ORL, oncologie, médecine interne, hémodialyse, soins courants, physiologie respiratoire, clinique de pédiatrie</p> <p>Gare</p> <p>Radiologie, cardiologie et médecine nucléaire</p> <p>GMF, UMF, clinique médicale</p> <p>Dispensaires</p> <p>SAD et autres services communautaires</p>	<p><u>Instaurer en présence d'usagers/résidents/répondant à la définition de zone tiède ou chaude.</u></p> <p><u>Instaurer lorsque l'utilisateur n'est pas en mesure de porter le masque de procédure.</u></p> <p><b><u>(exemple : ORL)</u></b></p> <p><b><u>N. B. Lors d'instauration :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porter le N95 en continu;</li> <li>• Le changer lorsque souillé, humide, à la pause, au dîner (max. 8 h);</li> <li>• Utiliser un maximum de 4 masques N95 par quart de 8 h.</li> </ul>
<p><b>Triage</b></p> <p>CDD</p> <p>Unité en éclosion</p>	<p><u>L'environnement est considéré tiède, car présence de cas tiède en continu et de clientèle non dépistée en continu.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porter le N95 en continu;</li> <li>• Le changer lorsque souillé, humide, à la pause, au dîner (max. 8 h);</li> <li>• Utiliser un maximum de 4 masques N95 par quart de 8 h.</li> </ul>

Milieux	Consignes pour le port du N95 <u>par le personnel</u>
RTF Adulte  RTF Jeunesse	<p><b><u>Instaurer seulement en présence d'usagers/résidents/département répondant à la définition de zone tiède ou chaude.</u></b></p> <p><b>Pour les professionnels ne vivant pas dans la RTF :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer les précautions additionnelles gouttelettes/contact renforcées avec protection oculaire et <b>N95</b> dès l'entrée dans la maison.</li> </ul> <p><b>Pour les responsables des ressources et leurs remplaçants :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'équipement de protection n'est pas nécessaire : suivre les consignes de la Santé publique (consignes de la communauté).</li> </ul>
Visiteur/PPA	<p><b>Le N95 est requis lorsque :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite d'utilisateur positif;</li> <li>• Unité en éclosion.</li> </ul>
Laboratoire Archives	<p><b>Le masque de procédure est requis dans votre secteur.</b></p> <p>Lors de déplacement sur une unité, appliquer les mesures en vigueur.</p>

Usagers/résidents/milieux où le port du N95 n'est pas requis (résumé)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun cas COVID-19 positif;</li> <li>• Aucune éclosion;</li> <li>• Unité avec usagers/résidents répondant aux critères suivants :           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sans symptômes suggestifs pour la COVID-19, nouveaux ou aggravés;</li> <li>ET</li> <li>✓ sans aucune exposition documentée à un cas connu ou un milieu où il y a une éclosion de COVID-19 (ex. : CHSLD, RPA) dans les 14 derniers jours;</li> <li>ET</li> <li>✓ ayant reçu un résultat négatif à un test de dépistage pour le SRAS-CoV-2 <b>OU</b> port du masque en continu chez l'utilisateur.</li> </ul> </li> </ul>

*L'équipe PCI/SSQVT*