

La santé recherchée

Bulletin d'information sur l'état de santé de la population nord-côtière

Volume 8 Numéro 2

Septembre 2009



L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes en 2007 Autres faits saillants pour la région nord-côtière

Présentation

Ce bulletin de « La santé recherchée » constitue un deuxième numéro destiné à présenter sommairement les premiers résultats des données recueillies en 2007, auprès des Nord-Côtières âgées de 12 ans et plus, dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)¹ menée par Statistique Canada. Il sera notamment question de la santé physique et mentale de la population nord-côtière ainsi que des services préventifs et des services de première ligne.

Méthode et utilisation des tableaux

Les données proviennent d'un tableau CANSIM² diffusé sur le site Web de l'organisme en juin 2008. L'analyse n'est donc possible pour l'instant qu'en fonction du sexe et de l'âge. Des changements apportés en 2007 à la conception même de l'ESCC par Statistique Canada font en sorte que les données sont désormais recueillies sur une base continue auprès d'environ 65 000 répondants, tout au long de l'année, et ce, chaque année. Auparavant, on interrogeait 130 000 personnes sur une période de douze mois, tous les deux ans. Les données sont maintenant diffusées chaque année. Avant 2007, elles l'étaient aux deux ans, soit quelque six mois après la fin de la période de collecte auprès de tous les répondants de l'enquête³. En 2007, quelque 600 personnes ont été interrogées sur la Côte-Nord, comparativement à environ 12 000 au Québec et 66 000 dans l'ensemble du Canada. Le taux de réponse pour la Côte-Nord se situe à 80,3 %, comparativement à 78 % pour le Québec et à 77,6 % au Canada. Les résultats sont représentatifs de l'année 2007 seulement⁴.

Les estimations touchant le nombre d'individus concernés par une caractéristique apparaissant dans les tableaux sont arrondies à la centaine la plus près, en suivant généralement les directives de Statistique Canada.

1. De plus amples informations au sujet de l'ESCC apparaissent dans l'encadré « Note méthodologique sur l'enquête » à la fin de ce document.

2. http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.pgm?regtk=&C2Sub=&ARRAYID=1050501&C2DB=PRD&VEC=&LANG=F&SrchVer=2&ChunkSize=50&SDDSLOC=&ROOTDIR=CII/&RESULTTEMPLATE=CII/CII_PICK&ARRAY_PICK=1&SDDSID=&SDDSDDESC=

3. THOMAS, Steven et Sylvain TREMBLAY. *Interprétation des estimations de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) remaniée*, Ottawa, Statistique Canada. [s.d.], 8 p.

4. Au moment de la révision finale de ce texte au printemps 2009, les données de 2008 et de l'ensemble de la période 2007-2008 n'étaient pas encore disponibles sur le site de Statistique Canada.



Les données d'une enquête par sondage constituent toutes des estimations des valeurs réelles de la population concernée. Par conséquent, toute enquête par sondage comporte invariablement des erreurs dues à l'échantillonnage que l'on peut mesurer à l'aide de l'erreur-type des estimations. Dans les tableaux de ce bulletin, cette erreur-type est exprimée sous la forme de coefficients de variation. Le coefficient de variation se veut tout simplement le résultat, en pourcentage, de la division de l'erreur-type par l'estimation elle-même. Selon la pratique en vigueur à Statistique Canada, lorsque le coefficient de variation est inférieur ou égal à 16,5 %, la donnée peut être, sauf exceptions⁵, diffusée sans contrainte ni annotation particulière. Un coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % caractérise une mesure plutôt imprécise. Cette dernière peut être généralement diffusée pour autant qu'elle s'accompagne d'une mise en garde relative à l'imprécision de la donnée ou à sa variabilité d'échantillonnage. Dans les tableaux présentés ici, un astérisque (*) est accolé aux estimations dont les coefficients de variation se situent entre 16,6 % et 33,3 %. Des tirets (---) remplacent les valeurs non diffusées par Statistique Canada dans son tableau CANSIM en raison de leur qualité jugée inacceptable (coefficient de variation supérieur à 33,3 %).

Nous publions les intervalles de confiance à 95 % calculés par Statistique Canada à l'égard des pourcentages observés sur la Côte-Nord. Nous ne publions pas ceux du Québec. Un intervalle de confiance permet de présenter la probabilité que la valeur vraie d'une population, au regard d'une caractéristique, se situe à l'intérieur d'une plage de valeurs. Les intervalles de confiance permettent aussi de comparer les proportions entre deux populations (par exemple la Côte-Nord et le Québec) sur la même caractéristique. Lorsque les intervalles de confiance de deux proportions sont disjoints, on peut conclure qu'un écart observé est significatif à un seuil donné (généralement 95 %). Dans ces cas, il n'existe que 5 % de risque que l'ESCC 2007 ait détecté, à tort, une différence significative entre les deux pourcentages. On dira aussi qu'il n'y a que 5 % de risque que cette différence soit uniquement le fruit du hasard. Quand un écart s'avérait significatif au seuil de 95 %, nous avons aussi calculé un test statistique (appelé valeur Z de la différence) au seuil de 99 %. Le cas échéant, on réduit à 1 % le risque que l'enquête permette, erronément, de déceler un écart significatif entre deux observations.

Faits saillants

La santé physique

Les données dont il sera question dans cette rubrique ont trait à la prévalence de certaines maladies chroniques au sein de la population régionale âgée de 12 ans et plus ainsi qu'à la présence d'embonpoint et d'obésité chez les individus de 18 ans et plus. Dans le contexte de l'ESCC, les maladies chroniques sont définies comme des problèmes autodéclarés de santé, diagnostiqués par un professionnel de la santé et qui ont duré ou devaient durer six mois ou plus. Il faut préciser qu'aucune mesure indépendante n'a été employée pour valider cliniquement les dires des répondants. En outre, le recours au poids et à la taille autodéclarés, pour calculer l'indice de masse corporelle (IMC), peut entraîner une certaine sous-estimation de la prévalence de l'embonpoint et, surtout, de l'obésité, notamment chez les personnes plus âgées. Les maladies chroniques abordées dans ce bulletin sont l'arthrite, l'asthme, le diabète et l'hypertension.

Arthrite

En vertu des résultats de l'ESCC 2007, environ 11 % de la population nord-côtière souffre d'arthrite. La même proportion est rapportée à l'échelle provinciale. La proportion régionale représente quelque 7 800 personnes. L'enquête ne permet pas de faire ressortir une différence significative entre les hommes et les femmes, que ce soit sur la Côte-Nord ou dans l'ensemble du Québec. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont proportionnellement plus nombreuses que celles âgées de 45 à 64 ans à éprouver ce problème de santé (30 % c. 14 %). La prévalence de l'arthrite au sein des autres groupes d'âge sur la Côte-Nord n'est pas diffusée par Statistique Canada en raison de l'imprécision de la donnée.

5. L'estimation doit être fondée sur au moins 30 répondants. Dans le cas contraire, Statistique Canada recommande de ne pas diffuser la donnée quelle que soit la valeur du coefficient de variation.



Tableau 1

Personne ayant déclaré souffrir d'arthrite selon le sexe et le groupe d'âge,
population âgée de 12 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)	Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe					
Homme	3 200	8	* 9	[5,4 ; 12,0]	19,4
Femme	4 600	14	13	[9,6 ; 16,3]	13,2
Groupe d'âge					
12 à 19 ans	---	---	---	---	---
20 à 34 ans	---	* 1	---	---	---
35 à 44 ans	---	4	---	---	---
45 à 64 ans	3 700	15	* 14	[8,7 ; 18,9]	18,9
65 ans et plus	3 300	34	30	[20,4 ; 39,6]	16,4
Population totale	7 800	11	11	[8,4 ; 13,2]	11,4

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007).

Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

--- Donnée trop peu fiable pour être publiée par Statistique Canada.

Asthme

Sur la Côte-Nord, quelque 7 500 personnes indiquent souffrir d'asthme. Ce nombre correspond à 10 % de la population régionale vivant en ménage privé. La différence avec la proportion provinciale (8 %) n'est pas significative au plan statistique. Cependant, les hommes nord-côtiers (11 %) sont significativement plus nombreux que ceux du Québec (7 %) à rapporter des problèmes d'asthme. Bien qu'aucune différence significative selon l'âge ne ressorte de l'enquête, la prévalence de l'asthme sur la Côte-Nord a tendance à être plus élevée au sein des plus jeunes groupes d'âge. Au Québec, cette prévalence ne varie pas significativement selon l'âge, bien que les 12 à 19 ans tendent à mentionner ce problème de santé en plus grand nombre que les autres groupes d'âge.

Élément intéressant, même si le volet régional de l'ESCC 2007 ne permet pas de faire ressortir une différence significative entre les sexes, les hommes de la Côte-Nord semblent plus sujets que les femmes à faire de l'asthme (11 % c. 9 %). Or, au Québec, on observe le phénomène inverse (9 % chez les femmes c. 7 % chez les hommes). Dans la province, l'écart entre les sexes se révèle significatif.

Tableau 2

Personne ayant déclaré souffrir d'asthme selon le sexe et le groupe d'âge,
population âgée de 12 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)	Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe					
Homme	4 200	7	* 11 ●	[7,0 ; 15,4]	19,1
Femme	3 300	9	* 9	[5,4 ; 13,4]	21,9
Groupe d'âge					
12 à 19 ans	1 600	10	* 19	[8,7 ; 29,4]	27,7
20 à 34 ans	2 100	9	* 15	[7,2 ; 22,9]	26,6
35 à 44 ans	---	7	---	---	---
45 à 64 ans	1 900	8	* 7	[3,0 ; 11,1]	29,2
65 ans et plus	900	7	* 8	[3,1 ; 13,7]	32,0
Population totale	7 500	8	10	[7,8 ; 12,8]	12,3

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

--- Donnée trop peu fiable pour être publiée par Statistique Canada.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

● Estimation significativement plus élevée au seuil de 95 %.



Diabète

D'après les données de l'enquête, la prévalence du diabète sur la Côte-Nord chez les 12 ans et plus se situerait à environ 8 %. La maladie toucherait donc environ 6 100 personnes. En proportion, le diabète atteint significativement plus de personnes dans la région nord-côtière qu'au Québec (6 %). Les hommes nord-côtiers ne se distinguent pas significativement de ceux du Québec (9 % c. 7 %), tandis qu'on compte proportionnellement davantage de femmes diabétiques sur la Côte-Nord qu'au Québec (8 % c. 5 %). La ventilation des données selon l'âge démontre que les personnes âgées résidant sur la Côte-Nord sont aussi, en proportion, plus nombreuses que celles du Québec à souffrir de cette maladie (28 % c. 16 %).

Tableau 3

Personne ayant déclaré souffrir de diabète selon le sexe et le groupe d'âge, population âgée de 12 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)	Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe					
Homme	3 200	7	* 9	[5,4 ; 12,0]	19,6
Femme	2 900	5	* 8	● [5,3 ; 11,0]	17,8
Groupe d'âge					
12 à 19 ans	---	---	---	---	---
20 à 34 ans	---	* 0,6	---	---	---
35 à 44 ans	---	* 2	---	---	---
45 à 64 ans	2 400	9	* 9	[5,8 ; 12,4]	18,4
65 ans et plus	3 100	16	* 28	● [17,6 ; 39,0]	19,2
Population totale	6 100	6	8	● [6,2 ; 10,6]	13,2

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

--- Donnée trop peu fiable pour être publiée par Statistique Canada.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

● Estimation significativement plus élevée au seuil de 95 %.

Hypertension

En 2007, l'ESCC établit à 20 % la proportion de la population nord-côtière qui déclare faire de l'hypertension, ce qui représente environ 14 200 personnes. L'écart observé en regard de la mesure québécoise (16 %) n'est pas significatif statistiquement. La prévalence de l'hypertension varie en fonction de l'âge; elle augmente avec le vieillissement de la population. Dans la région, plus de la moitié des personnes âgées (56 %) se disent hypertendues, comparativement à 23 % des individus âgés de 45 à 64 ans. Au Québec, la proportion de la population qui rapporte faire de l'hypertension atteint 46 % chez les 65 ans et plus, comparativement à 22 % des 45 à 64 ans.

Tableau 4

Personne ayant déclaré souffrir d'hypertension selon le sexe et le groupe d'âge, population âgée de 12 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)	Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe					
Homme	7 200	15	20	[14,2 ; 24,8]	13,8
Femme	7 000	17	20	[14,1 ; 25,5]	14,6
Groupe d'âge					
12 à 19 ans	---	---	---	---	---
20 à 34 ans	---	* 2	---	---	---
35 à 44 ans	1 100	5	---	---	---
45 à 64 ans	6 000	22	23	[15,4 ; 29,9]	16,3
65 ans et plus	6 000	46	56	[43,9 ; 67,3]	10,7
Population totale	14 200	16	20	[15,9 ; 23,4]	9,7

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007).

Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

--- Donnée trop peu fiable pour être publiée par Statistique Canada.



Embonpoint et obésité

On parle d'embonpoint lorsque l'indice de masse corporelle (IMC) se situe entre 25 et 29. La personne dont l'IMC atteint ou dépasse 30 est considérée comme obèse. Cet indice se calcule en divisant le poids en kilogrammes, par le carré de la taille exprimée en mètres. Par exemple, une personne de 91 kilos (environ 200 livres) qui mesure 1,83 m (environ 6 pieds) aura un IMC de 27 $[91/(1,83^2)]$. Dans ce bulletin, la prévalence de l'embonpoint et de l'obésité concerne la population adulte de 18 ans et plus. Les femmes enceintes sont exclues du calcul de l'indice. Il convient de rappeler que cette prévalence est basée sur des données autodéclarées, lesquelles peuvent entraîner une sous-déclaration de l'embonpoint, mais plus vraisemblablement de l'obésité. Des mesures anthropométriques prises en 2005 sur un sous-échantillon de la population canadienne durant l'ESCC 2005 ont révélé un écart d'environ huit points de pourcentage entre les données mesurées et autodéclarées quant à la prévalence de l'obésité⁶.

Le tableau 5 montre que 43 % de la population régionale âgée de 18 ans et plus fait de l'embonpoint, en regard de 32 % de la population du Québec. La valeur de la Côte-Nord dépasse significativement le pourcentage québécois (seuil de 99 %). Les hommes nord-côtiers s'avèrent, de manière significative, plus sujets que ceux de la province à faire de l'embonpoint (51 % c. 38 %). On remarque une tendance similaire, bien que non significative, pour les femmes nord-côtières, comparativement à celles du Québec (34 % c. 26 %). Quant aux groupes d'âge, un seul se démarque statistiquement du groupe québécois correspondant. Il s'agit des 45 à 64 ans (52 % c. 36 %).

Tableau 5

Personne atteinte d'embonpoint selon le sexe et le groupe d'âge, population âgée de 18 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)		Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe						
Homme	17 200	38	51	◆	[41,5 ; 61,2]	9,8
Femme	10 200	26	34		[25,6 ; 42,1]	12,5
Groupe d'âge						
18 à 19 ans	---	* 12	---		---	---
20 à 34 ans	4 100	24	* 34		[21,3 ; 45,8]	18,7
35 à 44 ans	5 200	32	41		[27,9 ; 53,5]	16,0
45 à 64 ans	13 700	36	52	◆	[42,6 ; 60,5]	8,9
65 ans et plus	4 100	35	38		[27,2 ; 48,7]	14,5
Population totale	27 400	32	43	◆	[36,2 ; 49,9]	8,1

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

--- Donnée trop peu fiable pour être publiée par Statistique Canada.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

◆ Estimation significativement plus élevée au seuil de 99 %.

Sur la Côte-Nord, en 2007, on comptait environ 15 % de personnes obèses, soit une proportion identique à celle du Québec. Le tableau 6 illustre une seule différence significative entre la région et l'ensemble de la province. Elle se situe au sein du groupe des 45 à 64 ans. On remarque que les Nord-Côtiers et Nord-Côtières se distinguent de l'ensemble des Québécois du même âge par une proportion significativement moindre de personnes obèses (11 % c. 18 %).

6. DUFOUR, Renée, Carmen BELLEROSÉ et autres. *Faits saillants-Santé publique. Le point sur le surplus de poids : En suivi du rapport de la Directrice 2005...*, Longueuil, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, Juin 2007, p. 4.



Tableau 6

**Personne atteinte d'obésité selon le sexe et le groupe d'âge,
population âgée de 18 ans et plus, Côte-Nord, 2007**

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)	Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe					
Homme	4 500	16	* 13	[8,8 ; 18,3]	17,9
Femme	4 900	14	16	[12,0 ; 20,4]	13,3
Groupe d'âge					
18 à 19 ans	---	---	---	---	---
20 à 34 ans	1 200	11	* 10	[3,7 ; 15,6]	31,5
35 à 44 ans	2 300	17	* 18	[8,1 ; 27,6]	27,9
45 à 64 ans	3 000	18	* 11	[6,5 ; 15,8]	21,1
65 ans et plus	2 700	15	* 25	[13,8 ; 36,7]	23,1
Population totale	9 400	15	15	[11,4 ; 18,1]	11,6

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

--- Donnée trop peu fiable pour être publiée par Statistique Canada.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

■ Estimation significativement moins élevée au seuil de 99 %.

La santé mentale

Cette section fait état des résultats relatifs à la perception de la santé mentale ainsi qu'au stress ressenti dans la vie quotidienne.

Perception de la santé mentale

Les personnes enquêtées ont été invitées à répondre à la question suivante : « *En général, diriez-vous que votre santé mentale est : « excellente », « très bonne », « bonne », « passable » ou « mauvaise » ?* ».

Selon les données obtenues, près de huit résidents nord-côtiers sur dix (78 %) perçoivent leur santé mentale comme « excellente » ou « très bonne ». Cette proportion se compare à celle enregistrée dans l'ensemble du Québec (75 %). La seule différence significative observable entre la Côte-Nord et le Québec est identifiée dans le groupe des personnes âgées de 20 à 34 ans. Les Nord-Côtiers de cet âge sont proportionnellement plus nombreux que ceux du Québec (90 % c. 78 %) à considérer leur santé mentale sous ce jour favorable.

Tableau 7

**Personne percevant sa santé mentale comme excellente ou très bonne selon le sexe et le groupe d'âge,
population âgée de 12 ans et plus, Côte-Nord, 2007**

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)	Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe					
Homme	27 800	76	75	[69,7 ; 80,7]	3,7
Femme	28 600	75	80	[74,8 ; 85,7]	3,5
Groupe d'âge					
12 à 19 ans	6 200	79	76	[66,2 ; 84,8]	6,3
20 à 34 ans	12 600	78	90	[82,6 ; 97,5]	4,2
35 à 44 ans	10 300	75	80	[70,0 ; 89,9]	6,4
45 à 64 ans	19 500	74	73	[64,6 ; 81,6]	6,0
65 ans et plus	7 800	70	72	[61,8 ; 81,8]	7,1
Population totale	56 400	75	78	[74,2 ; 81,1]	2,3

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

◆ Estimation significativement plus élevée au seuil de 99 %.



Stress ressenti dans la vie quotidienne

La question portant sur le stress dans la vie quotidienne se lit comme suit : « *En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont : « pas du tout stressantes », « pas tellement stressantes », « un peu stressantes », « assez stressantes » ou « extrêmement stressantes »?* ».

Au sein de la population nord-côtière, environ deux personnes sur dix (20 %) évaluent leurs journées comme habituellement « assez » ou « extrêmement » stressantes. Cette proportion est significativement inférieure à celle du Québec (26 %). Toute proportion gardée, les hommes de la région expriment moins ce niveau de stress que ceux du Québec (18 % c. 26 %). Même si les femmes nord-côtières ne diffèrent pas significativement de celles du Québec, on observe chez elles une tendance similaire (22 % c. 27 %). Pareillement, une proportion significativement plus faible de jeunes nord-côtiers âgés de 20 à 34 ans considèrent leurs journées comme habituellement « assez » ou « extrêmement stressantes » (11 % c. 32 %). À l'instar de la situation provinciale, l'enquête ne permet pas de détecter un écart statistique entre les hommes et les femmes de la région sur cette dimension (18 % c. 22 %).

Tableau 8

Personne éprouvant un stress assez ou extrêmement intense dans la vie quotidienne selon le sexe et le groupe d'âge, population âgée de 15 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)		Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe						
Homme	6 300	26	* 18	*	[12,0 ; 23,8]	16,8
Femme	7 500	27	22		[16,4 ; 27,8]	13,2
Groupe d'âge						
15 à 19 ans	---	20	---		---	---
20 à 34 ans	1 500	32	* 11	■	[5,1 ; 16,2]	26,7
35 à 44 ans	3 200	36	* 25		[11,4 ; 38,2]	27,5
45 à 64 ans	7 500	27	* 28		[16,8 ; 39,4]	20,6
65 ans et plus	---	11	---		---	---
Population totale	13 800	26	20	■	[15,4 ; 24,6]	11,7

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

--- Donnée trop peu fiable pour être publiée par Statistique Canada.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

* Estimation significativement moins élevée au seuil de 95 %.

■ Estimation significativement moins élevée au seuil de 99 %.

Les services préventifs

Les services préventifs dont il est question sous cette rubrique ont trait à l'accès à un médecin régulier, à la consultation d'un médecin dans les 12 mois précédant l'enquête ainsi qu'à la vaccination contre la grippe.

Accès à un médecin régulier

En incluant les médecins de famille, environ quatre résidents de la Côte-Nord sur cinq (80 %) déclarent pouvoir compter sur les services d'un médecin régulier; ce qui surpasse significativement la proportion du Québec (73 %). Sur cet aspect de l'accès aux services de santé, les Nord-Côtières vivent une situation comparable à celle des Québécoises (84 % c. 82 %). En revanche, toute proportion gardée, les hommes nord-côtiers sont plus nombreux que ceux du Québec (76 % c. 65 %) à affirmer avoir un médecin régulier. Le même constat peut être formulé au sujet du groupe composé des personnes âgées de 20 à 34 ans où la Côte-Nord se démarque du Québec d'une manière significative (73 % c. 56 %).



Tableau 9

Personne ayant un médecin régulier (y compris un médecin de famille) selon le sexe et le groupe d'âge, population âgée de 12 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)		Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe						
Homme	28 200	65	76	◆	[71,3 ; 81,2]	3,3
Femme	30 000	82	84		[77,3 ; 91,2]	4,2
Groupe d'âge						
12 à 19 ans	6 200	65	76		[64,2 ; 88,0]	7,9
20 à 34 ans	10 200	56	73	◆	[60,7 ; 84,4]	8,3
35 à 44 ans	9 700	69	76		[65,2 ; 85,9]	7,0
45 à 64 ans	21 800	82	82		[74,6 ; 88,8]	4,4
65 ans et plus	10 300	93	95		[91,2 ; 98,7]	2,0
Population totale	58 200	73	80	◆	[75,5 ; 84,9]	3,0

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

◆ Estimation significativement plus élevée au seuil de 99 %.

Consultation d'un médecin dans les 12 mois précédant l'enquête

Au cours de la période de référence, près de huit personnes sur dix (79 %) vivant sur la Côte-Nord ont consulté un médecin (médecin de famille, omnipraticien, pédiatre). La région se compare au Québec (75 %). Aucun groupe nord-côtier ne se différencie significativement du Québec sauf les 20 à 34 ans qui s'avèrent, en proportion, plus nombreux que les Québécois (85 % c. 69 %) à avoir consulté un tel professionnel de la santé dans les 12 mois ayant précédé l'enquête.

Tableau 10

Personne ayant consulté un médecin dans les 12 mois précédant l'enquête selon le sexe et le groupe d'âge, population âgée de 12 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)		Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe						
Homme	28 700	68	78	◆	[70,6 ; 84,6]	4,6
Femme	28 300	83	80		[72,1 ; 87,1]	4,8
Groupe d'âge						
12 à 19 ans	5 000	57	62		[43,8 ; 79,5]	14,7
20 à 34 ans	11 900	69	85	◆	[77,1 ; 93,0]	4,8
35 à 44 ans	9 700	71	76		[65,2 ; 85,8]	6,9
45 à 64 ans	21 500	81	81		[72,1 ; 88,9]	5,3
65 ans et plus	8 900	90	82		[72,3 ; 91,9]	6,1
Population totale	57 000	75	79		[72,6 ; 84,6]	3,9

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

◆ Estimation significativement plus élevée au seuil de 99 %.

Vaccination contre la grippe dans l'année précédant l'enquête

Dans la région, près de quatre personnes sur dix (39 %), chez les 12 ans et plus, se sont fait vacciner contre la grippe dans les 12 mois précédant l'entrevue de l'ESCC. Au Québec, la proportion de personnes vaccinées durant la même période s'avère moindre (25 %). Les femmes nord-côtières se distinguent des Québécoises (45 % c. 28 %), de même que les hommes de la région par rapport à ceux du Québec (33 % c. 21 %). Que ce soit au Québec ou sur la Côte-Nord, les femmes se font vacciner en plus grand nombre que les hommes. Pour la Côte-Nord, des calculs statistiques révèlent une différence significative selon le sexe, et ce, même si les intervalles de confiance se recoupent légèrement.

Hormis la catégorie des personnes de 65 ans et plus, tous les autres groupes d'âge de la population nord-côtier se démarquent des groupes correspondants de la population québécoise par des proportions plus élevées de personnes vaccinées contre la grippe durant l'année précédant l'enquête.



À partir de 35 ans, le pourcentage d'individus vaccinés a tendance à augmenter avec l'âge. Cependant, sur la Côte-Nord, la seule différence significative concerne les 65 ans et plus (69 %) vis-à-vis les autres catégories d'âge.

Tableau 11

Personne ayant reçu un vaccin antigrippal dans l'année précédant l'enquête selon le sexe et le groupe d'âge, population âgée de 12 ans et plus, Côte-Nord, 2007

Catégorie	Population estimée Côte-Nord	Québec (%)	Côte-Nord (%)		Intervalle de confiance à 95 %	Coefficient de variation (%)
Sexe						
Homme	12 300	21	33	◆	[27,0 ; 39,6]	9,7
Femme	16 000	28	45	●	[38,4 ; 51,1]	7,2
Groupe d'âge						
12 à 19 ans	3 000	8	* 36	◆	[21,7 ; 51,1]	20,6
20 à 34 ans	3 100	12	* 22	●	[13,2 ; 30,9]	20,4
35 à 44 ans	4 000	17	* 31	●	[20,2 ; 42,5]	18,1
45 à 64 ans	10 800	27	40	◆	[32,2 ; 48,1]	10,1
65 ans et plus	7 400	60	69	◆	[59,7 ; 77,4]	6,6
Population totale	28 300	25	39	◆	[34,4 ; 43,5]	6,0

* L'estimation est légèrement imprécise, la donnée doit donc être utilisée avec prudence.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2007). Tableau CANSIM 105-0501. Données téléchargées le 1^{er} juillet 2008.

Légende : Valeur de la Côte-Nord versus valeur du Québec

- ◆ Estimation significativement plus élevée au seuil de 99 %.
- Estimation significativement plus élevée au seuil de 95 %.

Yves Therriault, Ph. D.
Agent de planification,
programmation et de recherche

Note méthodologique sur l'enquête

Les renseignements de cette section sont tirés du *Guide de l'utilisateur du fichier de microdonnées* de l'ESCC 2007. Cette enquête « vise à recueillir des renseignements sur l'état de santé, l'utilisation des services de santé et les déterminants de la santé de la population canadienne » dans 118 régions sociosanitaires provinciales et trois régions sociosanitaires situées dans les territoires. Les données sont recueillies auprès des personnes de 12 ans et plus vivant en ménage privé. Les individus résidant en institution, les personnes domiciliées dans les réserves autochtones, le personnel à temps plein des Forces canadiennes et les gens de certaines régions éloignées sont exclus de la base de sondage. Environ 98 % de la population canadienne âgée de 12 ans et plus est visée par l'enquête.

Rappelons qu'en 2007, des changements ont été apportés dans la conceptualisation de l'enquête (voir section « Méthode »). La principale modification réside dans le fait que la cueillette de l'information se fait désormais de façon continue. L'échantillon total, qui conserve à peu près la même taille que lors des autres ESCC, est réparti en douze périodes de collecte de deux mois chacune.

Pour les dix provinces canadiennes, chacune des périodes de collecte est représentative de la population canadienne au cours des deux mois. Dans le cas des territoires, l'échantillon s'avère représentatif pour une période de douze mois.

Un seul questionnaire a été utilisé. Les entrevues se déroulaient en face à face ou au téléphone, dépendamment de la base de sondage d'où provenait le ménage sélectionné au hasard pour participer à l'enquête. Dans chaque ménage, un seul répondant, aussi choisi aléatoirement, a été sélectionné pour répondre au questionnaire. La durée moyenne de l'entrevue est estimée entre 40 à 45 minutes.



Note méthodologique sur l'enquête (suite)

Une partie du questionnaire est commune à l'ensemble des régions sociosanitaires canadiennes. Outre les questions habituelles d'ordre sociodémographique et socioéconomique, le **contenu commun** comporte un ensemble de questions dites « de base » (d'une durée d'environ 20 minutes) ainsi qu'une section « thématique » (d'une durée d'environ 10 minutes). Il est prévu que le contenu de base demeure à peu près inchangé sur une période de six ans. Le contenu thématique renferme des questions rattachées à un sujet spécifique.

Une autre partie du questionnaire réfère au contenu optionnel (durée de 10 minutes environ). Le volet optionnel vise à permettre aux provinces et aux régions sociosanitaires de choisir des questions pour satisfaire leur besoin d'information en matière de santé publique. En 2007, toutes les régions du Québec ont choisi les mêmes thèmes optionnels. Les données provenant du contenu optionnel ne sont pas généralisables à l'ensemble du Canada, sauf si un même module optionnel est choisi par toutes les régions sociosanitaires canadiennes. Cela ne s'est encore jamais produit.

Enfin, une dernière section dite « à réponse rapide » a été offerte aux organisations qui désiraient obtenir des estimations pour l'ensemble du Canada sur un sujet particulier touchant la santé de la population, moyennant recouvrement des coûts. Le contenu à réponse rapide n'apparaît au questionnaire que pendant une seule période de collecte (deux mois). Les questions sont alors demandées à tous les répondants de l'ESCC au cours de cette période de deux mois.

Il convient de mentionner que les données de l'ESCC 2007 diffusées par Statistique Canada sur son site Web (tableau CANSIM) en juin 2008 incluent au dénominateur les non-répondants éventuels à une question donnée (non-réponse partielle). Dans ces cas, les pourcentages mentionnés dans les tableaux produits dans ce numéro tiennent donc compte de la non-réponse partielle. Cela a pour effet de faire diminuer les pourcentages observés.

Rédaction

© Yves Therriault, Ph.D.

Agent de planification, programmation et de recherche

et

Responsable du bulletin « *La santé recherchée* »

Révision

© Nicole Boudreau

Directrice de la planification,
des ressources informationnelles et financières

© Pascal Paradis

Conseiller en communication

Mise en page

© Cynthia Desrosiers

Traitement de texte et mise en page

Disponible sur le site Internet de l'Agence :

www.agencesante09.gouv.qc.ca

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1703-4620

Agence de la santé
et des services sociaux
de la Côte-Nord

Québec

